



Reiseimpfungen

Wir empfehlen ca. 6 Wochen vor Antritt einer Reise eine individuelle Beratung in Anspruch zu nehmen. (Impfempfehlungen variieren je nach Reisedestination, Reisedauer, Reisetil etc.)

- Überprüfung/Aktualisierung der altersgemäßen Standardimpfungen

Reiseimpfungen je nach Zielland und Reiseroute

- Chikungunya
- Cholera
- Dengue
- Gelbfieber
- Hepatitis A/B
- Japanische Enzephalitis
- Meningokokken
- Poliomyelitis
- Tollwut
- Typhus



Team der Spezialambulanz

Senior:innen ab 60 Jahre

Besonders wichtige Impfungen

- Pneumokokken (ÖIP)
- Herpes Zoster (ÖIP)
- RSV (Respiratorisches Synzytial Virus) einmalig für ≥ 3 Saisonen
- Influenza (ÖIP) saisonal
- COVID-19 (ÖIP) alle (6)-12 Monate



Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
 Medizinische Universität Wien
 Kinderspitalgasse 15
 Erdgeschoß rechts
 1090 Wien



**Geimpft –
 Geschützt –
 Sicher!**

Empfohlene Impfungen laut
 Österreichischem Impfplan

pii.meduniwien.ac.at/impfambulanz

Kontakt

Medizinische Universität Wien
 Spezialambulanz für Impfungen, Reise- und
 Tropenmedizin
 Ärztliche Leitung:
 Ursula Wiedermann-Schmidt
 Kinderspitalgasse 15
 1090 Wien

Tel.: +43 (0)1 40160 – 38280
 Fax: +43 (0)1 40160 – 938280
lsptm-impfungen@meduniwien.ac.at
pii.meduniwien.ac.at/impfambulanz

Öffnungszeiten
 Mo: 8:30 – 14:00 Uhr, Di bis Fr: 8:30 – 12:00 Uhr

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Rektor Markus Müller, Medizinische Universität Wien. Für den Inhalt verantwortlich: Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin: Ursula Wiedermann-Schmidt. Fotocredits: Cover: MedUni Wien/Houdek, Potoroyalty/shutterstock.com (Frau), Marina Demidiuk/shutterstock.com (Baby), Iryna Shraiber/shutterstock.com (Mädchen), Prostock-studio/shutterstock.com (Paar), Gruppenbild: Peter Provaznik. Stand: Mai 2026

Säuglinge und Kleinkinder

Kostenfreies Kinderimpfprogramm

- **Rotavirus**
ab der 7. Woche 2-3 Impfungen (impfstoffabhängig)
Im Abstand von mind. 4 Wochen bis zur vollendeten 24./32. Lebenswoche
- **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae B, Hepatitis B**
(6-fach-Impfung) ab der 7. Lebenswoche, 2+1 Schema 0-2-6 Monate
- **Pneumokokken**
2+1 Schema PCV15 - 15-valenter konjugierter Impfstoff ab der 7. Lebenswoche, 2+1 Schema 0-2-6 Monate, Erstimpfung im 2. Lebensjahr: 2 Impfungen im Abstand von 2 Monaten (abweichendes Schema bei Hochrisikopersonen)
- **Influenza**
saisonal ab dem 7. Lebensmonat, bei Erstimpfung 2 Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen (bis zum vollendeten 9. Lebensjahr)
Intranasaler Lebendimpfstoff zw. 2 u. 18 Jahren
- **Masern-Mumps-Röteln**
2 Impfungen im Mindestabstand von 3 Monaten ab dem vollendeten 9. Lebensmonat (4 Wochen bei Impfbeginn ab dem ersten Geburtstag)



Nicht kostenfrei

- **Meningokokken B**
ab dem vollendeten 2. Lebensmonat, Impfschema abhängig vom Alter
- **Meningokokken ACWY**
im 13. Lebensmonat, Impfschema abhängig von Alter und Indikation
- **Varizellen**
2 Impfungen im Abstand von mind. (4)-6 Wochen ab dem 13. Lebensmonat
- **FSME**
2+1 Schema ab dem 13. Lebensmonat: 2. Dosis nach 1-3 Monaten, 3. Dosis 5/9-12 Monate nach der 2. Dosis (impfstoffabhängig), 1. Auffrischung nach 3 Jahren, danach alle 5 Jahre
- **Pneumokokken**
PCV20 - 20 valenter konjugierter Impfstoff ab der 7. Woche, 3+1 Schema (alternativ zu PCV15)



Schulkinder

Kostenfreies Kinderimpfprogramm

- **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis**
(4-fach-Impfstoff) – Auffrischung ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, 2. Auffrischung 5 Jahre danach bis zum 14./15. Lebensjahr)
- **Hepatitis B**
Auffrischung, ab dem vollendeten 7. Lebensjahr (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) oder Nachholen der Grundimmunisierung 0-1-6 Monate
- **Humane Papillomaviren (HPV)**
ab dem vollendeten 9. Lebensjahr, kostenfrei bis zum 21. Geburtstag: 2 Dosen im Abstand von 6-12 Monaten 2+1 Schema bei spezieller Indikation
- **Meningokokken ACWY**
einmalige Impfung zwischen 11. und 13. Lebensjahr
- **COVID-19**
ab dem vollendeten 12. Lebensjahr einmalige Impfung alle (6)-12 Monate
- **Influenza** saisonal
Intranasaler Lebendimpfstoff zw. 2 u. 18 Jahren
- **Masern-Mumps-Röteln**
bei Ungeimpften oder Nicht-immunen: Impfung nachholen (2x)

Nicht kostenfrei

- **Varizellen**
Nachholimpfung bei Ungeimpften oder Nicht-immunen (2x)
- **FSME**
Auffrischung alle 5 Jahre
- **Meningokokken B+ACWY**
Nachholimpfungen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr empfohlen

Erwachsene

Kostenfrei / öffentliches Impfprogramm (ÖIP)

- **Masern-Mumps-Röteln**
bei Ungeimpften oder Nicht-immunen: Impfung nachholen (2x)
- **Influenza** saisonal
- **COVID-19**
einmalige Impfung alle (6)-12 Monate bei spezieller Indikation: Mindestabstand 4 Monate möglich
- **Herpes Zoster**
ab 18 Jahren bei spezieller Indikation
- **Pneumokokken**
ab 18 Jahren bei spezieller Indikation

Nicht kostenfrei

- **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis**
(4-fach-Impfstoff) – Auffrischung alle 5 Jahre; Polio bei Indikation alle 10 Jahre
- **FSME**
Auffrischung bis zum vollendeten 60. Lebensjahr alle 5 Jahre, danach alle 3 Jahre
- **Hepatitis B** – Grundimmunisierung nachholen bis 60 Jahre bei Indikation Auffrischung alle 10 Jahre
- **Humane Papillomaviren (HPV)**
empfohlen bis 30 Jahre, danach individuell (Impfschema je nach Alter / spezieller Indikation)
- **Varizellen**
Nachholimpfung bei Ungeimpften oder Nicht-immunen (2x) bis zum vollendeten 60. Lebensjahr

