



ABTEILUNG FÜR INFektionsDIAGNOSTIK UND INFektionSEPIDEMIOLOGIE

ZUWEISUNGSSCHEIN FÜR BAKTERIOLOGISCH SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN,
ANTIGEN-NACHWEIS, PCR

ALLGEMEINE BEFUNDAUSKUNFT

Tel.: 01 40160 33014 oder 33015

ÄRZTLICHE BEFUNDAUSKUNFT

Tel.: 01 40160 33026 oder 33013

PROBENANNAHME

Tel.: 01 40160 33014 oder 33015

Fax: 01 40160 933010

(nicht ausfüllen)

Prot. Nr.

Eingangsdatum

Auftragsetikette

Einsender:

NAME und ADRESSE (Blockschrift oder
Stempel):

Tel.

Kontaktperson:

Patienten:innendaten:

Familienname/Vorname:

Adresse:

SVNr				Geburtsdatum:			
				Tag	Monat	Jahr	

Geschlecht: ☐ weiblich

☐ männlich

☐ divers

☐ stationär / AZ:

☐ ambulant / Ambulanz-Zahl:

Bericht per

☐ Post

☐ Fax-Nr.

Der Auftraggeber garantiert die

Vertraulichkeit der Faxübermittlung

Verdachts-Diagnose

Krankheitsbeginn:

Abnahme-Datum:

Art des Untersuchungsmaterials (Mindestmenge 2 ml außer Liquor 1 ml)

☐ VOLLBLUT

☐ SERUM

☐ LIQUOR

☐ EDTA-Blut

☐ SONSTIGES:

Zweckmäßige serologische Untersuchungen bei Verdachtsdiagnose									
☐ Arthritis ASL; CRP; RF; Borrelia burgdorferi IgG (EIA); Chlamydia trachomatis IgA/G; Mycoplasma pneumonia IgA/G; Salmonella (Widal Aggl.); Yersinia IgAGM (EIA)		☐ Status febrilis Anaplasma phagocytophilum IgG; Bartonella henselae IgG; Brucella spp. (MAT); Coxiella burnetii Ph II IgGM (EIA); Francisella tularensis (MAT); Leptospira spp. IgGM; Rickettsien (Weil-Felix Aggl.); Salmonella (Widal Aggl)		Infektionen des Zentral-Nervensystems Liquor und Serum vom selben Tag einsenden! ☐ Lyme-Neuroborreliose: Borrelia burgdorferi-IgG-AI IgG-AI = Liquor-Serum-IgG-Antikörper-Index; Albumin & Gesamt-IgG in Liquor und Serum ☐ Coccidioides IgGM / EIA (Liquor, Serum) ☐ Cryptococcus neoformans AG / EIA (Liquor, Serum) ☐ Mycoplasma hominis IgG / EIA (Serum) ☐ Mycoplasma pneumoniae IgAGM / EIA (Serum) ☐ # CXCL13 Nachweis im Liquor / EIA intrathekaler Entzündungsindikator, erregerspezifisch					
☐ Lymphadenitis / Lymphadenose Bartonella henselae IgG; Brucella spp. (MAT); Chlamydia trachomatis IgAG (EIA); Coxiella burnetii Ph II IgGM (EIA); Francisella tularensis (MAT); Rickettsien (Weil-Felix Aggl)		☐ Systemische, tiefe Pilzinfektion Candida albicans AK, AG; Coccidioides IgM/G; Cryptococcus neoformans AK, AG; Aspergillus IgG; Histoplasma AK; Blastomyces AK ☐ Tiefe Infektion Urogenitaltrakt Candida albicans AK, AG; Chlamydia trachomatis IgAG; Mycoplasma hominis IgG; Ureaplasma urealyticum IgG							
Serologische Einzeluntersuchungen Bakterien / Test									
☐ ASL, CRP, RF / IN ☐ Anaplasma phagocytophilum / IIFT ☐ Bartonella henselae IgGM / IIFT ☐ Bartonella quintana IgGM / IIFT ☐ Bordetella pertussis Toxin IgAG / EIA ☐ Borrelia burgdorferi IgGM / EIA ☐ * Borrelia Western-Blot IgG / IB ☐ * Borrelia Western-Blot IgM / IB ☐ Brucella spp. AK / MAT ☐ Brucella spp. IgAGM / EIA ☐ Campylobacter spp. IgAG / EIA ☐ Chlamydia spp. IgAGM / EIA		☐ Chlamydia pneumoniae IgAGM / EIA ☐ Chlamydia psittaci IgAGM / IIFT ☐ Chlamydia trachomatis IgM / EIA ☐ Chlamydia trachomatis IgAG / EIA ☐ Coxiella burnetii Phase II/I IgGM / EIA ☐ * Coxiella burnetii Phase II IgGM / IIFT ☐ * Coxiella burnetii Phase I IgGM / IIFT ☐ Francisella tularensis AK / Aggl ☐ Francisella tularensis IgGM / EIA ☐ Legionella pneumophila 1-7 IgGM / EIA ☐ Legionella pneumophila 1-14 AG Harn / EIA ☐ Leptospira spp. IgGM / EIA		☐ Mycoplasma hominis IgG / EIA ☐ Mycoplasma pneumoniae IgAGM / EIA ☐ Rickettsia conorii IgGM / IIFT ☐ Rickettsia typhi IgGM / IIFT ☐ Rickettsien AK / Weil-Felix Aggl ☐ Salmonella HA-D, OA-D AK /Widal Aggl ☐ Treponema pallidum AK / HA ☐ Treponema pallidum IgGM / IIFT ☐ Treponema pallidum Cardiolipin AK / RPR ☐ Ureaplasma urealyticum IgG/ EIA ☐ Yersinia IgAGM/ EIA ☐ * Yersinia IgAG / IB					
Serologische Einzeluntersuchungen Pilze / Test									
☐ Aspergillus fumigatus IgG/ EIA ☐ # Aspergillus fumigatus IgM/ EIA ☐ **Aspergillus Galaktomannan-AG / EIA ☐ Blastomyces AK / ID		☐ Candida spp. AK / HA ☐ Candida spp. AG / EIA ☐ Coccidioides IgGM / EIA		☐ Cryptococcus neoformans AK / Aggl ☐ Cryptococcus neoformans AG / EIA ☐ Histoplasma AK / ID					
*PCR, DNA-Nachweis von ... (bei ambulanten Patient: innen können pro Krankenschein nur 2 PCR-Untersuchungen verrechnet werden)									
☐ Anaplasma phagocytophilum EDTA-Blut, Liquor ☐ Bartonella henselae Lymphknoten (Biopsie, nativ oder Paraffin, Punktat), EDTA-Blut ☐ Bordetella pertussis Nasopharyngealsekret, transnasaler Abstrich ☐ Bordetella parapertussis Nasopharyngealsekret, transnasaler Abstrich ☐ Borrelia burgdorferi Lyme-Borreliose Hautbiopsie, -Stanze; Gelenkspunktat, Synovialis-Biopsie, Liquor, Herzmuskelbiopsie, EDTA-Blut ☐ Borrelia miyamotoi EDTA-Blut, Liquor ☐ Borrelia spp. Rückfallfieber-Borrelien EDTA-Blut, Liquor ☐ Candidatus Neoehrlichia mikurensis EDTA-Blut ☐ Chlamydia pneumoniae Bronchoalveoläre Lavage, Sputum, Nasopharyngealsekret, Gelenkspunktat, Synovialis-Biopsie, EDTA-Blut ☐ Chlamydia psittaci Bronchoalveoläre Lavage, Sputum, EDTA-Blut		☐ Chlamydia trachomatis Augenabstrich, Genitalsekret / Abstrich, Erststrahlharn, Gelenkspunktat, Synovialis- Biopsie ☐ # Chlamydia trachomatis-Serovar Serovar-Bestimmung setzt C. trachomatis Nachweis in Originalprobe voraus ☐ Coxiella burnetii EDTA-Blut ☐ Francisella tularensis Haut und Gewebe, Abstrich, Liquor, Sputum, Bronchoalveoläre Lavage, EDTA-Blut ☐ Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae Genitalsekret/Abstrich, Augenabstrich, Erststrahlharn, Gelenkspunktat ☐ Haemophilus influenzae Liquor, EDTA-Blut, Rachenabstrich ☐ Helicobacter pylori Magenbiopsie Nur Nachweis, keine Resistenzbestimmung ☐ Legionella pneumophila EDTA-Blut, Bronchoalveoläre Lavage, Pleuraexsudat, Sputum ☐ Leptospira interrogans EDTA-Blut, Liquor, Harn		☐ Listeria monocytogenes EDTA-Blut, Liquor, Vaginalabstrich, Fruchtwasser ☐ H. influenzae, N. meningitidis, St. pneumoniae Liquor, EDTA-Blut, Rachenabstrich ☐ Mycoplasma pneumoniae Bronchoalveoläre Lavage, Sputum, Nasopharyngealsekret, Gelenkspunktat, Synovialis-Biopsie, Liquor ☐ Neisseria gonorrhoeae Genitalsekret / Abstrich, Cervix-Abstrich, Augenabstrich, Erststrahlharn, Gelenkspunktat ☐ Neisseria meningitidis Liquor, EDTA-Blut, Rachen-Abstrich, Gelenkspunktat ☐ Rickettsia spp. EDTA-Blut, Eschar-Abstrich ☐ Staphylococcus aureus EDTA-Blut, Liquor, Sekrete, Abstrich ☐ MRSA Methicillin-resistente S. aureus EDTA-Blut, Liquor, Sekrete, Abstrich ☐ Streptococcus pneumoniae Liquor, EDTA-Blut, Rachenabstrich, Pleuraexsudat ☐ Treponema pallidum Liquor, Sekrete, Abstrich, Erststrahlharn					
<table> <tr> <td>Legende</td> <td>AG Antigen Aggl Agglutinationstest AK Antikörper</td> <td>EIA Enzymimmunoassay HA Hämagglutination IB Immunoblot</td> <td>ID Immun-Diffusionstest IIFT Indirekter Immunfluoreszenztest IN Immunephelometrie</td> <td>RPR Rapid plasma reagin MAT Mikroagglutinationstest</td> </tr> </table>					Legende	AG Antigen Aggl Agglutinationstest AK Antikörper	EIA Enzymimmunoassay HA Hämagglutination IB Immunoblot	ID Immun-Diffusionstest IIFT Indirekter Immunfluoreszenztest IN Immunephelometrie	RPR Rapid plasma reagin MAT Mikroagglutinationstest
Legende	AG Antigen Aggl Agglutinationstest AK Antikörper	EIA Enzymimmunoassay HA Hämagglutination IB Immunoblot	ID Immun-Diffusionstest IIFT Indirekter Immunfluoreszenztest IN Immunephelometrie	RPR Rapid plasma reagin MAT Mikroagglutinationstest					
* Kassenverrechenbar als Bestätigungstest. **Für ambulante Patient: innen nur Privatverrechnung möglich. Bitte Patient: in darüber informieren! # nur Privatverrechnung möglich									